


FICHE VARIETALE

BEMAREFO (PATATE DOUCE)

Nom Botanique	Origine	Obtention	Mainteneur	Agroécologie
<i>Ipomea batatas</i>	District d'Ambovombe	Sélection massale	CTAS	Zone Sud et Sud-ouest



CARACTERES MORPHOLOGIQUES

TYPE DE CROISSANCE	<i>rampant</i>
TIGE	
<i>Port :</i>	<i>rampant</i>
<i>Couleur :</i>	<i>vert</i>
FEUILLE	
<i>Couleur :</i>	<i>limbe vert foncé et nervure verte claire</i>
<i>Forme :</i>	<i>presque divisée *</i>
<i>Type de lobation :</i>	<i>très profond</i>
<i>Nervation :</i>	<i>palmée</i>
<i>Nombre des lobes :</i>	<i>5 à 7 lobes</i>
<i>Forme des lobes centraux</i>	<i>elliptique</i>
<i>Pigmentation anthocyanique des nervures /</i>	<i>petite</i>
FLEUR	
<i>Forme de la corolle:</i>	<i>ronde</i>
<i>Couleur :</i>	<i>corps blanc avec gorge pourpre</i>
TUBERCULE	
<i>Couleur primordiale de la peau :</i>	<i>blanche *</i>
<i>Couleur secondaire :</i>	<i>absent</i>
<i>Forme:</i>	<i>longue et irrégulière</i>
<i>Longueur (cm):</i>	<i>11 - 23</i>
<i>Section :</i>	<i>ronde</i>
CHAIR	
<i>Couleur dominant :</i>	<i>blanche à crème*</i>
<i>Couleur secondaire :</i>	<i>absent</i>
<i>Texture après cuisson :</i>	<i>quelques peu sèches</i>
<i>Goût :</i>	<i>légèrement sucré</i>

CARACTERES AGRONOMIQUES

<i>Cycle floraison (jours) :</i>	<i>92 - 120</i>
<i>Cycle à maturité (jours) :</i>	<i>125 - 145</i>
<i>Rendement moyen à l'hectare (t) :</i>	<i>9 - 11</i>
<i>Photopériodisme :</i>	<i>oui, jour court</i>

EXIGENCES PARTICULIERES

<i>Nombre de générations maximal autorisé</i>	<i>3</i>
---	----------

ASSOCIATIONS CULTURALES AUTORISEES

<i>Espèces associées :</i>	<i>céréales (maïs, sorgho, mil)</i>
----------------------------	-------------------------------------

* Caractère distinctif de la variété