


Nom Botanique	Origine	Obtention	Mainteneur	Agroécologie
<i>Opuntia inermis</i>	District d'Ambovombe	Sélection massale	CTAS	Zone Sud et Sud-ouest



CARACTERES MORPHOLOGIQUES

TIGE

Port :	dressé
Couleur :	verte claire

CLADODE

Couleur :	vert claire
Forme:	losangique*
Epaisseur :	moyenne
Largeur de phylloclade (cm):	10 - 20
Longueur phylloclade (cm)	25 - 40
Pilosité de la surface :	lisse
Nombre d'épines par aréole:	rare
Epine couleur principale	gris
Longueur d'épines(mm):	1– 10

FLEUR

Couleur :	jaune orangé *
Couleur de filaments de l'étamine :	jaune orange
Couleur de stigmate :	jaune*

FRUIT

Couleur :	jaune orange
Forme:	elliptique moyenne
Longueur (cm) :	5 - 7
Nombre par cladode:	2 - 10
Section :	ronde
Couleur de graine:	marron

CHAIR

Couleur :	jaune orange
-----------	--------------

CARACTERES AGRONOMIQUES

Période de floraison :	octobre - décembre
Période de maturité de fruit :	décembre - février
Photopériodisme :	oui, jour long
Goût :	sucré

EXIGENCES PARTICULIERES

Age de la plante mère :	à partir de la 2ème année de culture
Cladodes autorisées pour la multiplication :	phylloclades de 2ème ordre

ASSOCIATIONS CULTURALES AUTORISEES

Espèces associées :	céréales ou légumineuses
---------------------	--------------------------

* Caractère distinctif de la variété