FICHE VARIETALE

BESOLO
(PATATE DOUCE)

Nom Botanique	Origine	Obtention	Mainteneur	Agroécologie
Ipomea batatas	District d'Ambovombe	Sélection massale	CTAS	Zone Sud et Sud-ouest

CARACTERES MORPHOLOGIQUES	
TYPE DE CROISSANCE	*rampant*
TIGE	
Port :	*rampant*
Couleur :	*vert*
FEUILLE	
Couleur :	*limbe vert foncé et nervure verte claire*
Forme :	*presque divisée **
Type de lobation :	*très profond*
Nervation :	*palmée*
Nombre des lobes :	*5 à 7 lobes*
Forme des lobes centraux	*elliptique*
Pigmentation anthocyanique des nervures	*petite*
FLEUR	
Forme de la corolle:	*ronde*
Couleur :	*corps blanc avec gorge pourpre*
TUBERCULE	
Couleur primordiale de la peau :	*rouge pourpre **
Couleur secondaire de la peau :	*blanche*
Forme:	*ronde, elliptique**
Longueur (cm):	*12 - 17*
Section :	*ronde*
CHAIR	
Couleur dominante :	*jaune poussin**
Couleur secondaire :	*blanche*
Texture après cuisson :	*quelque peu sèche*
Goût :	*légèrement sucré*
CARACTERES AGRONOMIQUES	
Cycle floraison (jours) :	*88 - 96*
Cycle à maturité (jours) :	*120 - 140*
Rendement moyen à l'hectare (t) :	*15 - 23*
Photopériodisme :	*oui, jour court*
EXIGENCES PARTICULIERES	
Nombre de générations maximal autorisé	*3*
ASSOCIATIONS CULTURALES AUTORISEES	
Espèces associées :	*céréales (maïs, sorgho, mil)*

** Caractère distinctif de la variété*