FICHE VARIETALE

BETOROVOKE FOTY
(PATATE DOUCE)

Nom Botanique	Origine	Obtention	Mainteneur	Agroécologie
Ipomea batatas	District d'Ambovombe	Sélection massale	CTAS	Zone Sud et Sud-ouest

CARACTERES MORPHOLOGIQUES	
TYPE DE CROISSANCE	*rampant*
TIGE	
Port :	*rampant*
Couleur :	*verte claire*
FEUILLE	
Couleur :	*limbe et nervure verte claire*
Forme :	*lobée**
Type de lobation :	*modérément*
Nombre des lobes :	*3 à 5 lobes*
Forme des lobes centraux:	*semi-elliptique*
Nervation :	*palmée*
Pigmentation anthocyanique des nervures :	*petite*
FLEUR	
Forme de la corolle :	*ronde*
Couleur :	*blanc avec gorge pourpre*
TUBERCULE	
Couleur primordiale de la peau :	*blanche**
Couleur secondaire de la peau :	*absent*
Forme :	*irrégulière*
Longueur (cm) :	*10 - 23*
Section :	*ronde*
CHAIR	
Couleur dominante :	*blanche**
Couleur secondaire :	*absent*
Texture après cuisson :	*intermédiaire*
Goût :	*légèrement sucré*
CARACTERES AGRONOMIQUES	
Cycle floraison (jours) :	*93 - 103*
Cycle à maturité (jours) :	*120 - 140*
Rendement moyen à l'hectare (t) :	*7 - 12*
Photopériodisme :	*oui, jour court*
EXIGENCES PARTICULIERES	
Nombre de générations maximal autorisé	*3*
ASSOCIATIONS CULTURALES AUTORISEES	
Espèces associées :	*céréales (maïs, sorgho, mil)*

** Caractère distinctif de la variété*