

FICHE VARIETALE

BIBA (HARICOT)

Nom Botanique	Origine	Obtention	Mainteneur	Agroécologie
---------------	---------	-----------	------------	--------------


Phaseolus vulgaris

District d'Amboasary
Atsimo

Sélection massale

CTAS

Zone Sud et Sud-ouest



CARACTERES MORPHOLOGIQUES

TYPE DE CROISSANCE	<i>semi volubile à croissance indéterminée</i>
TIGE	
Port :	<i>semi volubile</i>
Couleur :	<i>verte</i>
Pilosité :	<i>pubescente</i>
FEUILLE	
Couleur :	<i>limbe et nervure vertes</i>
Type :	<i>composé, 3 folioles</i>
Disposition :	<i>folioles latérales opposées</i>
Pilosité :	<i>pubescente</i>
Stipule :	<i>minuscule</i>
Forme :	<i>ovale acuminée</i>
Nervation :	<i>réticulée</i>
Bordure :	<i>entière</i>
FLEUR	
Inflorescence :	<i>à l'aisselle du pétiole</i>
Couleur :	<i>étendard (blanche), aile(blanche), carène(blanche)</i>
GOUSSE	
Couleur :	<i>verte (fraîche), jaune (à maturité)</i>
Forme:	<i>courbée</i>
Type :	<i>fibreux</i>
Loge :	<i>4 à 6</i>
Ceinture :	<i>très peu marquée</i>
Déhiscence :	<i>oui, fente longitudinale (valve)</i>
Section :	<i>ronde</i>
GRAINE	
Couleur :	<i>blanche</i>
Texture :	<i>lisse</i>
Forme :	<i>aplatie rectangulaire*</i>
Brillance :	<i>brillant</i>
Nombre par gousse	<i>4 à 6</i>
Poids de 1000 grains (g) :	<i>550</i>

CARACTERES AGRONOMIQUES

Cycle floraison (jours) :	<i>45-57</i>
Cycle à maturité (jours) :	<i>87-102</i>
Rendement moyen à l'hectare (kg) :	<i>900-1000</i>
Photopériodisme :	<i>oui, jour court</i>

EXIGENCES PARTICULIERES

Nombre de générations maximal autorisé	<i>3</i>
--	----------

ASSOCIATIONS CULTURALES AUTORISEES

Espèces associées :	<i>céréales (maïs, sorgho, mil)</i>
Mode d'association :	<i>en interligne ou deux lignes de culture principale</i>

* Caractère distinctif de la variété