

Nom Botanique	Origine	Obtention	Mainteneur	Agroécologie
<i>Cajanus cajan</i>	District d'Ambovombe	Sélection massale	CTAS	Zone Sud et Sud-ouest



CARACTERES MORPHOLOGIQUES

TYPE DE CROISSANCE	<i>érigé</i>
TIGE	
<i>Couleur :</i>	<i>verte</i>
<i>Port :</i>	<i>arbuste</i>
<i>Pilosité :</i>	<i>glabre</i>
FEUILLE	
<i>Couleur :</i>	<i>limbe et nervure verts</i>
<i>Type :</i>	<i>composé, 3 folioles</i>
<i>Pilosité :</i>	<i>pubescente</i>
<i>Forme :</i>	<i>ovale obtus</i>
<i>Nervation :</i>	<i>réticulée</i>
<i>Bordure :</i>	<i>entière</i>
FLEUR	
<i>Inflorescence :</i>	<i>aux bourgeons terminaux</i>
<i>Couleur :</i>	<i>jaune sur toutes les faces (étendard); jaune blanchâtre (carène); jaune (aile)*</i>
GOUSSE	
<i>Couleur :</i>	<i>verte (fraiche), beige clair (à maturité)</i>
<i>Forme :</i>	<i>peu courbée</i>
<i>Type :</i>	<i>fibreux</i>
<i>Loge :</i>	<i>5-8</i>
<i>Ceinture :</i>	<i>marquée</i>
<i>Déhiscence :</i>	<i>non</i>
<i>Section :</i>	<i>plate</i>
GRAINE	
<i>Couleur :</i>	<i>blanc crème, tachetée de marron</i>
<i>Forme :</i>	<i>arrondie</i>
<i>Nombre par gousses :</i>	<i>5-7</i>
<i>Poids de 1 000 graines (g) :</i>	<i>170-200</i>

CARACTERES AGRONOMIQUES

<i>Cycle floraison (jours) :</i>	<i>variable selon la période de semis</i>
<i>Cycle à maturité (jours) :</i>	<i>variable selon la période de semis</i>
<i>Rendement moyen à l'hectare (kg) :</i>	<i>600-950</i>
<i>Photopériodisme :</i>	<i>oui, jour court</i>

EXIGENCES PARTICULIERES

<i>Nombre de générations maximal autorisé :</i>	<i>3</i>
---	----------

ASSOCIATIONS CULTURALES AUTORISEES

<i>Espèces associées :</i>	<i>tubercules (patate douce, manioc), légumineuses (niébé, dolique, konoke, mucuna, pois du cap) et cucurbitacées</i>
<i>Mode d'association :</i>	<i>en interligne ou deux lignes de la culture principale</i>

* Caractère distinctif de la variété