


Nom Botanique	Origine	Obtention	Mainteneur	Agroécologie
<i>Dolichos lablab</i>	District d'Ambovombe	Sélection massale	CTAS	Zone Sud et Sud-ouest



CARACTERES MORPHOLOGIQUES

TYPE DE CROISSANCE	<i>semi-érigé et grimpante</i>
TIGE	
Couleur :	<i>verte</i>
Port :	<i>volubile</i>
Pilosité :	<i>pubescente</i>
FEUILLE	
Couleur :	<i>limbe et nervure verts</i>
Type :	<i>composé, 3 folioles</i>
Pilosité :	<i>pubescente</i>
Stipule :	<i>minuscule</i>
Nervation :	<i>réticulée</i>
Bordure :	<i>entière</i>
FLEUR	
Inflorescence :	<i>à l'aisselle du pétiole, en racème</i>
Couleur :	<i>blanche</i>
Hauteur de la hampe florale (cm) :	<i>25-50</i>
GOUSSE	
Couleur :	<i>beige (à maturité)</i>
Forme :	<i>Courbée en croissant</i>
Type :	<i>fibreux</i>
Loge :	<i>3-5</i>
Ceinture :	<i>très peu marquée</i>
Bordure :	<i>rugueuse</i>
Section :	<i>plate</i>
GRAINE	
Couleur :	<i>blanc crème*</i>
Forme :	<i>rénoïforme plate</i>
Brillance de la graine :	<i>très peu brillant</i>
Caroncule :	<i>très développé, blanc</i>
Nombre par gousses :	<i>3-5</i>
Poids de mille graines (g) :	<i>240-270</i>

CARACTERES AGRONOMIQUES

Cycle floraison (jours) :	<i>90-100</i>
Cycle à maturité (jours) :	<i>150-180</i>
Rendement moyen à l'hectare (kg) :	<i>600-800</i>
Photopériodisme :	<i>oui, jour court</i>

EXIGENCES PARTICULIERES

Nombre de générations maximal autorisé :	<i>4</i>
--	----------

ASSOCIATIONS CULTURALES AUTORISEES

Espèces associées :	<i>céréales (maïs, sorgho), ricin</i>
Mode d'association :	<i>en interligne ou deux lignes de culture principale</i>

* Caractère distinctif de la variété