FICHE VARIETALE

MANDRONONO
(Haricot blanc)

Nom Botanique	Origine	Obtention	Mainteneur	Agroécologie
Phaseolus vulgaris	District d'Ambovombe	Sélection massale	CTAS	Zone humide





CARACTERES MORPHOLOGIQUES	
TYPE DE CROISSANCE	*nain à croissance indéterminée**
TIGE	
Couleur :	*verte*
Port :	*volubile **
Pilosité :	*pubescente*
FEUILLE	
Couleur :	*limbe et nervure verts*
Type :	*composé, 3 folioles*
Disposition :	*folioles latérales opposées*
Pilosité :	*pubescente*
Stipule :	*minuscule*
Forme :	*ovale acuminée*
Nervation :	*réticulée*
Bordure :	*entière*
FLEUR	
Inflorescence :	*à l'aisselle du pétiole*
Couleur :	*blanche **
GOUSSE	
Couleur :	*jaune clair (à maturité)*
Forme :	*peu courbée*
Type :	*fibreux*
Loge :	*4-6*
Ceinture :	*très peu marquée*
Déhiscence :	*fente longitudinale (valve)*
Section :	*ronde*
GRAINE	
Couleur :	*blanche**
Forme :	*rognon*
Brillance de la graine :	*moyennement brillante*
Nombre par gousse :	*4-6*
Poids de 1 000 graines (g) :	*385-400*
CARACTERES AGRONOMIQUES	
Cycle floraison (jours) :	25-30
Cycle à maturité (jours) :	*95-100*
Rendement moyen à l'hectare (kg) :	*800-1 000*
Rendement au décorticage :	*75%*
Photopériodisme :	*oui, jour court*
EXIGENCES PARTICULIERES	
Nombre de générations maximal autorisé :	*4*
ASSOCIATIONS CULTURALES AUTORISEES	
Espèces associées :	*néant*

** Caractère distinctif de la variété*