

Nom Botanique	Origine	Obtention	Mainteneur	Agroécologie
<i>Phaseolus lunatus</i>	District d'Ambovombe	Sélection massale	CTAS	Zone Sud et Sud-ouest



CARACTERES MORPHOLOGIQUES

TYPE DE CROISSANCE	<i>grimpant-rampant pluriannuel (2 à 3 ans)</i>
TIGE	
Couleur :	<i>vert avec des rayures violettes *</i>
FEUILLE	
Couleur :	<i>limbe et nervures vert foncé</i>
Type :	<i>composé, 3 folioles</i>
Pilosité :	<i>pubescente sur la face inférieure</i>
Stipule :	<i>minuscule</i>
Bordure :	<i>entière</i>
FLEUR	
Longueur racème (cm) :	<i>10-20</i>
Couleur :	<i>vert clair (étendard); jaune verdâtre (carène); rose clair ou violet (ailes) *</i>
GOUSSE	
Couleur :	<i>beige (à maturité)</i>
Forme :	<i>peu courbée</i>
Type :	<i>fibreux</i>
Loge :	<i>3-6</i>
Ceinture :	<i>très peu marquée</i>
Section :	<i>plate</i>
GRAINE	
Couleur :	<i>aubergine *</i>
Forme :	<i>répiforme arrondie</i>
Caroncule :	<i>néant</i>
Nombre par gousse :	<i>3-4</i>
Poids de 1 000 graines (g) :	<i>350-375</i>

CARACTERES AGRONOMIQUES

Cycle floraison (jours) :	<i>70-90</i>
Cycle à maturité (jours) :	<i>120-150</i>
Rendement moyen à l'hectare (kg) :	<i>600-800</i>
Photopériodisme :	<i>oui, jour court</i>

EXIGENCES PARTICULIERES

Nombre de générations maximal autorisé :	<i>4</i>
--	----------

ASSOCIATIONS CULTURALES AUTORISEES

Espèces associées :	<i>céréales (maïs, sorgho), ricin</i>
Mode d'association :	<i>en interligne ou deux lignes de culture principale seulement en première année de culture</i>

*Caractère distinctif de la variété