

Nom Botanique	Origine	Obtention	Mainteneur	Agroécologie
<i>Phaseolus vulgaris</i>	District d'Ambovombe	Sélection massale	CTAS	Zone Sud et Sud-ouest



CARACTERES MORPHOLOGIQUES

TYPE DE CROISSANCE	<i>grimpant-rampant</i>
TIGE	
Couleur :	<i>verte foncée</i>
Pilosité :	<i>néant</i>
FEUILLE	
Couleur :	<i>limbe et nervures verts</i>
Type :	<i>composé, 3folioles</i>
Nervation :	<i>arquée</i>
Disposition :	<i>folioles latérales opposées</i>
Bordure :	<i>entière</i>
Pilosité :	<i>glabre</i>
FLEUR	
Inflorescence :	<i>à l'aisselle du pétiole</i>
Couleur :	<i>étendard (vert clair sur la face inférieure et blanche sur la face supérieure, aile (blanche) carène (vert claire)</i>
GOUSSE	
Couleur :	<i>verte (fraîche), beige (maturité)</i>
Forme:	<i>peu courbée</i>
Loge :	<i>3-5</i>
Déhiscence :	<i>oui, fente longitudinale</i>
Type :	<i>fibreuse</i>
Ceinture :	<i>très peu marquée</i>
Section :	<i>plate</i>
GRAIN	
Couleur du grain :	<i>blanche tachetée de grenat sur la partie apicale*</i>
Forme :	<i>rénoiforme plate</i>
Hile:	<i>blanc</i>
Poids de 1000 grains (g) :	<i>1200</i>

CARACTERES AGRONOMIQUES

Cycle floraison (jours) :	<i>70-85</i>
Cycle à maturité (jours) :	<i>150-165</i>
Rendement moyen à l'hectare (kg) :	<i>1200-2000</i>
Photopériodisme :	<i>oui, jour court</i>

EXIGENCES PARTICULIERES

Nombre de générations maximal autorisé 3

ASSOCIATIONS CULTURALES AUTORISEES

Espèces associées :	<i>céréales (maïs, sorgho), ricin</i>
Mode d'association :	<i>en interligne ou deux lignes de culture principale seulement en première année de culture</i>

* Caractère distinctif de la variété