FICHE VARIETALE

PELAMAINTY
(PATATE DOUCE)

Nom Botanique	Origine	Obtention	Mainteneur	Agroécologie
Ipomea batatas	District d'Ambovombe	Sélection massale	CTAS	Zone Sud et Sud-ouest

CARACTERES MORPHOLOGIQUES	
TYPE DE CROISSANCE	*rampant*
TIGE	
Port :	*couché sans enracinement*
Couleur :	*verte pourpre**
FEUILLE	
Couleur :	*limbe et nervure principale verte pourpre*
Forme :	*hastées **
Type de lobation :	*profond*
Nervation :	*palmée*
Nombre des lobes :	*5 à 7 lobes*
Forme des lobes centraux	*elliptique*
Pigmentation anthocyanique des nervures	*grande*
FLEUR	
Forme de la corolle:	*ronde*
Couleur :	*corps blanc avec gorge pourpre*
TUBERCULE	
Couleur primaire :	*rouge claire **
Couleur secondaire :	*blanche*
Forme:	*longue et elliptique*
Longueur (cm):	*11 - 23*
Section :	*ronde*
CHAIR	
Couleur dominant :	*orange pâle*
Couleur secondaire :	*blanche*
Texture après cuisson :	*quelques peu sèche*
Goût :	*légèrement sucré*
CARACTERES AGRONOMIQUES	
Cycle floraison (jours) :	*93 - 103*
Cycle à maturité (jours) :	*128 - 143*
Rendement moyen à l'hectare (kg) :	*12 - 19*
Photopériodisme :	*oui, jour court*
EXIGENCES PARTICULIERES	
Nombre de générations maximal autorisé	*3*
ASSOCIATIONS CULTURALES AUTORISEES	
Espèces associées :	*céréales (maïs, sorgho, mil)*

** Caractère distinctif de la variété*