

Nom Botanique	Origine	Obtention	Mainteneur	Agroécologie
<i>Dolichos lablab</i>	District d'Ambovombe	Sélection massale	CTAS	Zone Sud et Sud-ouest



CARACTERES MORPHOLOGIQUES

TYPE DE COISSANCE semi-érigé-grimpant

TIGE

Couleur : verte

Port : volubile

Pilosité : pubescente

FEUILLE

Couleur : limbe et nervures vertes

Type : composé, 3 folioles

Bordure : entière

Pilosité : pubescente

Stipule : minuscule

Nervation : réticulée

FLEUR

Inflorescence : à l'aisselle du pétiole, en racème

Couleur : blanche

Hauteur de la hampe florale (cm) : 6 - 13

GOUSSE

Couleur : beige (à la maturité)

Forme : courbée en croissant

Type : fibreux

Loge : 3-5

Ceinture : très peu marquée

Bordure : lisse

Section : plate

GRAINE

Couleur : marron clair *

Forme : réniforme plate de grande taille

Caroncule : très développée, de couleur blanche

Nombre par gousse : 3-5

Poids de 1000 grains (g) : 260 - 280

CARACTERES AGRONOMIQUES

Cycle floraison (jours) : 60-80

Cycle à maturité (jours) : 120-150

Rendement moyen à l'hectare (kg) : 450

Photopériodisme : oui, jour court

EXIGENCES PARTICULIERES

Nombre de générations maximal autorisé : 3

ASSOCIATIONS CULTURALES AUTORISEES

Espèces associées : céréales (maïs, sorgho), ricin

Mode d'association : en interligne ou deux lignes de culture principale

* Caractère distinctif de la variété