

FICHE VARIETALE

SAREFANGITSE (PATATE DOUCE)

Nom Botanique	Origine	Obtention	Mainteneur	Agroécologie
<i>Ipomea batatas</i>	District d'Ambovombe	Sélection massale	CTAS	Zone Sud et Sud-ouest



CARACTERES MORPHOLOGIQUES

TYPE DE CROISSANCE	<i>rampant</i>
TIGE	
Port :	<i>rampant</i>
Couleur :	<i>vert</i>
FEUILLE	
Couleur :	<i>limbe et nervure verte claire</i>
Forme :	<i>presque divisée *</i>
Type de lobation :	<i>très profond</i>
Nervation :	<i>palmée</i>
Nombre des lobes :	<i>4 à 6 lobes</i>
Forme des lobes centraux	<i>elliptique</i>
Pigmentation anthocyannique des nervures	<i>grande</i>
FLEUR	
Forme de la corolle:	<i>ronde</i>
Couleur :	<i>corps blanc avec gorge pourpre</i>
TUBERCULE	
Couleur primaire :	<i>rose claire *</i>
Couleur secondaire :	<i>absent</i>
Forme:	<i>ovale et longue, irrégulière</i>
Longueur (cm):	<i>13-30</i>
Section :	<i>ronde</i>
CHAIR	
Couleur dominant :	<i>jaune pâle*</i>
Couleur secondaire :	<i>blanche</i>
Texture après cuisson :	<i>très moelleuse</i>
Goût :	<i>pas sucré</i>

CARACTERES AGRONOMIQUES

Cycle floraison (jours) :	<i>93-103</i>
Cycle à maturité (jours) :	<i>125-140</i>
Rendement moyen à l'hectare (t) :	<i>18 - 23</i>
Photopériodisme :	<i>oui, jour court</i>

EXIGENCES PARTICULIERES

Nombre de générations maximal autorisé	<i>3</i>
--	----------

ASSOCIATIONS CULTURALES AUTORISEES

Espèces associées :	<i>céréales (maïs, sorgho, mil)</i>
---------------------	-------------------------------------

* Caractère distinctif de la variété