

Nom Botanique	Origine	Obtention	Mainteneur	Agro écologie
<i>Sorghum bicolor</i>	District d'Ambovombe	Sélection massale	CTAS	Zone Sud et Sud-ouest



CARACTERES MORPHOLOGIQUES

TIGE

Couleur :	verte
Forme :	cylindrique pleine
Port :	érigé
Pilosité :	néant

FEUILLE

Couleur :	limbe vert et nervure blancs
Type :	simple
Disposition :	alterne
Degré de zigzag :	faible
Pilosité :	néant
Nervation :	parallèle
Bordure :	entière

PANICULE

Forme :	ovale
Type :	semi compact - très lâche
Longueur (cm) :	20 - 30

GRAIN

Couleur :	blanche crème*
Forme :	arrondie
Texture :	cornée
Poids de 1 000 grains (g) :	28 - 35

CARACTERES AGRONOMIQUES

Cycle floraison (jours) :	50 - 60
Cycle à maturité (jours) :	90 - 100
Hauteur de la plante (cm) :	100 - 150
Rendement moyen à l'hectare (kg) :	700 - 1200
Photopériodisme :	non

EXIGENCES PARTICULIERES

Nombre de générations maximal autorisé :	3
--	---

ASSOCIATIONS CULTURALES AUTORISEES

Espèces associées :	légumineuses (dolique, konoke, niébé, arachide, pois de terre, pois de cap, mucuna, antisoroko) et cucurbitacées
Mode d'association :	en dérobée d'au moins 15 jours pour les espèces associées grimpantes en interligne ou deux lignes de sorgho

* Caractère distinctif de la variété