FICHE VARIETALE

TSIPOY
(CAJANUS)

Nom Botanique	Origine	Obtention	Mainteneur	Agroécologie
Cajanus cajan	District d'Ambovombe	Sélection massale	CTAS	Zone Sud et Sud-ouest

CARACTERES MORPHOLOGIQUES	
TYPE DE COISSANCE	*érigé*
TIGE	
Couleur :	*verte*
Port :	*arbuste*
Pilosité :	*glabre*
FEUILLE	
Couleur :	*limbe et nervure vertes*
Type :	*composé, 3 folioles*
Pilosité :	*pubescente*
Forme :	*ovale largement acuminée*
Nervation :	*réticulée*
Bordure :	*entière*
FLEUR	
Inflorescence :	*aux bourgeons terminaux*
Couleur :	*grenat strié sur la face inférieure et jaune strié rose sur la face supérieure (étendard) ; jaune blanchâtre (carène); jaune (aile)**
GOUSSE	
Couleur :	*verte (fraîche), beige clair (à la maturité)*
Forme :	*peu courbée*
Type :	*fibreux*
Loge :	*5-6*
Ceinture :	*marquée*
Déhiscence :	*non*
Section :	*plate*
GRAINE	
Couleur :	*blanche tachetée de pourpre à partir du hile **
Forme :	*arrondie*
Nombre par gousses :	*5-6*
Poids de 1000 grains (g) :	*140-150*
CARACTERES AGRONOMIQUES	
Cycle floraison (jours) :	*variable suivant la date de semis*
Cycle à maturité (jours) :	*variable suivant la date de semis*
Rendement moyen à l'hectare (kg) :	*600-800*
Photopériodisme :	*oui, jour long*
EXIGENCES PARTICULIERES	
Nombre de générations maximal autorisé :	*3*
ASSOCIATIONS CULTURALES AUTORISEES	
Espèces associées :	*tubercules (patate douce, manioc), légumineuses (niébé, dolique, konoke, mucuna, pois du cap) et cucurbitacées*
Mode d'association :	*en interligne ou deux lignes de la culture principale*

** Caractère distinctif de la variété*