

Nom Botanique	Origine	Obtention	Mainteneur	Agro écologie
<i>Vigna umbellata</i>	District d'Ambovombe	Sélection massale	CTAS	Zone Sud et Sud-ouest



CARACTERES MORPHOLOGIQUES

TYPE DE CROISSANCE	<i>semi-érigé</i>
TIGE	
Couleur :	<i>verte</i>
FEUILLE	
Couleur :	<i>limbe et nervures verts</i>
Type :	<i>composé, 3 folioles</i>
Pilosité :	<i>pubescente</i>
Bordure :	<i>entière</i>
FLEUR	
Couleur:	<i>jaune sur la face supérieure et jaune verdâtre sur la face inférieure (étendard); jaune (carène); jaunes (ailes)</i>
GOUSSE	
Couleur :	<i>verte (frais), marron très foncé (à maturité)</i>
Forme :	<i>cylindrique</i>
Déhiscence:	<i>oui</i>
Ceinture :	<i>très peu marqué</i>
Section :	<i>ronde</i>
GRAINE	
Couleur :	<i>jaune verdâtre*</i>
Hile :	<i>blanc*</i>
Forme :	<i>cylindrique</i>
Poids de 1 000 graines (g) :	<i>180-210</i>

CARACTERES AGRONOMIQUES

Cycle floraison (jours) :	<i>50-60</i>
Cycle à maturité (jours) :	<i>110-120</i>
Rendement moyen à l'hectare (kg) :	<i>700-1100</i>
Photopériodisme :	<i>oui, jour court</i>

EXIGENCES PARTICULIERES

Nombre de générations maximal autorisé :	<i>4</i>
--	----------

ASSOCIATIONS CULTURALES AUTORISEES

Espèces associées :	<i>céréales (maïs, sorgho), ricin</i>
Mode d'association :	<i>en interligne ou deux lignes de culture principale</i>

* Caractère distinctif de la variété