

| Nom commun | Nom Botanique        | Dénomination   | Origine | Obtention         | Mainteneur | Agroécologie    | Année d'homologation |
|------------|----------------------|----------------|---------|-------------------|------------|-----------------|----------------------|
| Amberique  | <i>Vigna radiata</i> | Antsoroko mena | Boeny   | Sélection massale | FOFIFA     | Zone Nord-Ouest | 2025                 |



### CARACTERES MORPHOLOGIQUES

#### PLANTE

Port de la plante Rampant \*

Type de croissance Déterminé

#### FEUILLE

Type Composé trifoliolé

Forme Triangulaire à base tronqué

Pilosité Absente\*

Bordure Entière

couleur Verte

#### FLEUR

Couleur de l'étendard intérieur Violet

Couleur de l'ail Violet

#### GOUSSE

Forme de courbure Convexe

Nombre de loge 6-16 loges

Ceinture Marquée

Déhiscence Peu marqué

Couleur Brun (à maturité)\*

Longueur 60-130mm

#### GRAINE

Couleur Rouge

Forme Réniforme

Dimension 5,54-6,4\*4,82-5,46mm

### CARACTERES AGRONOMIQUES

Saison de culture Pluvieuse et contre saison

Cycle à floraison 30-40 jours

Cycle à maturité 60-70 jours

Rendement à l'hectare 600-1300Kg/ha

Rendement au décorticage 75%

Poids de 1000 graines 100-110g

Fertilisation Répond très bien à la fertilisation

#### Comportement vis-à-vis de bio agresseurs et environnement

Pucerons Sensible

Fertilité de sol Peu exigeant

Pluie abondante Sensible (au stade de maturation) peut nuire à la qualité des graines

### AUTRES TRAITS SPECIFIQUES

Résistant à la sécheresse

Caractères distinctifs de la variété: Port de la plante, couleur de la fleur, couleur de la gousse à maturité et des graines