

Nom commun	Nom Botanique	Origine	Obtention	Mainteneur	Agroécologie
Niébé	Vigna unguiculata	Boeny	Sélection massale	FOFIFA CRR Nord Ouest	Zone Nord-Ouest



CARACTERES MORPHOLOGIQUES

PLANTE

Port de la plante Rampant

Type de croissance Déterminé

FEUILLE

Type Composé trifoliolé

Forme Triangulaire à base tronquée

Rugosité Forte

Bordure Entière

couleur Verte

FLEUR

Couleur de l'étendard intérieur Violet

Couleur de l'ail Violet

GOUSSE

Forme de courbure Convexe

Nombre de loge 10-18 loges

Ceinture Faible

Déhiscence Absent

Couleur Blanc cassé (à maturité)

GRAINE

Couleur Rouge

Forme Réniforme

Dimension 9,37-10,4x7,79-8,8 mm

CARACTERES AGRONOMIQUES

Saison de culture Pluvieuse et contre saison

Type de sol préféré Baiboho

Cycle à floraison 40-50 jours

Cycle à maturité 70-80 jours

Rendement à l'hectare 800-900Kg/ha

Rendement au décortilage 70%

Poids de 1000 graines 198-203 g

Comportement vis-à-vis de bio agresseurs et environnement

Maladie de la mosaïque jaune du niébé (CYMV) Sensible

Fertilité de sol Exigeant

Pluie abondante Sensible (au stade de maturation) peut nuire à la qualité des graines

AUTRES TRAITS SPECIFIQUES

Variété commerciale

Caractère distinctif de la variété: couleur de la gousse et de la graine