

FENITRA

Nom commun	Nom botanique	Code d'origine	Nature génétique	Origine	Numéro de référence (collection FOFIFA)	Obtenteur	Année de diffusion	Année d'homologation	Mainteneur
Manioc	Manihot esculenta	521_IITA-TMS-KBH2016B	Clone	IITA	682	IITA	2022	2026	IITA FOFIFA



Feuille apical



Coupe transversale



* = caractère distinctif

Caractères morphologiques		
Plante	Port	Cylindrique
	Mode de ramification	Dichotomie
Tige	Couleur externe de la tige	Gris
	Couleur des branches apicales*	Pourpre
Feuilles	Couleur de la feuille	Vert foncé
	Couleur des pétioles*	Pourpre
	Couleur des feuilles apicales	Pourpre
	Pubescence des feuilles apicales	Absente
Tubercule	Forme	Cylindrique
	Couleur de la pulpe	Blanche
	Couleur de l'écorce externe	Blanchâtre
	Couleur de l'écorce interne	Marron claire
	Texture de l'écorce	Semi rugueuse
Caractères agronomiques et technologiques		
Cycle à maturité		8 à 12 mois
Précocité		Précoce <12
Rendement moyen (T/Ha)		54
Rendement optimal (T/Ha)		102
Comportement vis-à-vis au mosaïque (CMD)		Résistante
Matière sèche des tubercules (%)		32
Teneur en amidon (%)		23.4
Goût cru		Amer
Destination des racines		Transformation en farine

Recommandations agronomiques

Zones d'adaptation	Nord-Est, Haute terre centrale, Est
Type de sol préférentiel	Baiboho (alluvions)
Ecartement recommandé	1m x 0.8m
Technique de plantation	Culture sur butte ou en billon