

Nom commun	Nom botanique	Code d'origine	Nature génétique	Origine	Numéro de référence (collection FOIFA)	Obtenteur	Année de diffusion	Année d'homologation	Mainteneur
Manioc	Manihot esculenta	504_IITA-TMS-KBH2016B	Clone	Tanzanie	681	IITA	2022	2026	IITA FOIFA FIIFAMA-



Feuille apical



Coupe transversale



* = caractère distinctif

Caractères morphologiques		
Plante	Port	Cylindrique
	Mode de ramification	Dichotmie
Tige	Couleur externe de la tige	Argenté
	Couleur des branches apicales	vert
Feuilles	Couleur de la feuille	Vert foncé
	Couleur des pétioles*	Vert-jaunâtre
	Couleur des feuilles apicales	Vert violacé
	Pubescence des feuilles apicales	Absente
Tubercule	Forme	Cylindrique
	Couleur de la pulpe	Blanche
	Couleur de l'écorce externe	Marron claire
	Couleur de l'écorce interne	Blanchâtre
	Texture de l'écorce	Semi rugueuse
Caractères agronomiques et technologiques		
Cycle à maturité		8 à 12 mois
Précocité		Précoce <12
Rendement moyen (T/Ha)		76
Rendement optimal (T/Ha)		164
Comportement vis-à-vis au mosaïque (CMD)		Résistante
Matière sèche des tubercules (%)		40.6
Teneur en amidon (%)		30
Goût cru		Amer
Destination des racines		Transformation en farine

Recommandations agronomiques	
Zones d'adaptation	Nord-Est, Sud-Est, Haute terre centrale, Est
Type de sol	Baiboho (alluvions)
Espacement	1m x 1m
Technique de plantation	Culture sur butte ou en billon