

Voniaty

Nom commun	Nom botanique	Code d'origine	Nature génétique	Origine	Numéro de référence (collection FOIFA)	Obtenteur	Année de diffusion	Année d'homologation	Mainteneur
Manioc	Manihot esculenta	3038_IITA-TMS-KBH2018	Clone	IITA	684	IITA	2022	2026	IITA FOIFA FIFAMANOR



Feuille apical



Coupe transversale



* = caractère distinctif

Caractères morphologiques

Plante	Port	Parapluie
	Mode de ramification	Dichotomie
Tige	Couleur externe de la tige	Marron claire
	Couleur des branches apicales	Vert
Feuilles	Couleur de la feuille	Vert foncé
	Couleur des pétioles	Rouge verdâtre
	Couleur des feuilles apicales	Vert violacé
	Pubescence des feuilles apicales	Absente
Tubercule	Forme	Cylindroconique
	Couleur de la pulpe	Jaune
	Couleur de l'écorce externe	Marron claire
	Couleur de l'écorce interne	Jaune
	Texture de l'écorce	Semi rugueuse

Caractères agronomiques et technologiques

Cycle à maturité	8 à 12 mois
Précocité	Précoce <12
Rendement moyen (T/Ha)	53
Rendement optimal (T/Ha)	103
Comportement vis-à-vis au mosaïque (CMD)	Résistante
Matière sèche des tubercules (%)	35.9
Teneur en amidon (%)	33.7
Goût cru	Moyen
Destination des racines	Consommation directe et transformation en farine

Recommandations agronomiques

Zones d'adaptation	Nord-Est, Haute terre centrale, Sud-Est, Est
Type de sol préférentiel	Baiboho (alluvions)
Ecartement recommandé	1m x 1m
Technique de plantation	Culture sur butte ou en billon