


# Blé : Salohy

| Nom commun | Nom botanique            | Dénomination | Pedigree                                      | Date de diffusion 1994 | Nature génétique    | Origine | Obtenteur (date d'obtention)   | Code de collection | Mainteneur          |
|------------|--------------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| Blé        | <i>Triticum aestivum</i> | Salohy       | 4777#2//FNK/GB/3/<br>PVN/4/SARA/5/BUC/<br>BUL |                        | Lignée sélectionnée | CIMMYT  | CIMMYT (-)<br>FIFAMANOR (1992) | FIFAMANOR : 1028   | CIMMYT<br>FIFAMANOR |



## CARACTERES MORPHOLOGIQUES

|                                           |   |                               |
|-------------------------------------------|---|-------------------------------|
| • Coléoptile (anthocyane)                 | : | nulle                         |
| <b>FEUILLE</b>                            |   |                               |
| • Glaucescence de la gaine                | : | moyenne                       |
| <b>TIGE</b>                               |   |                               |
| • Port au tallage                         | : | mi-dressé (30°)               |
| • Paille (moelle en section transversale) | : | peu épaisse                   |
| <b>EPI</b>                                |   |                               |
| • Glaucescence du col de l'épi            | : | forte                         |
| • Glaucescence de l'épi                   | : | moyenne                       |
| • Forme (vue de profil)                   | : | fusiforme                     |
| • Compacité                               | : | lâche                         |
| • Longueur                                | : | très longue (11 cm)           |
| • Barbes ou arêtes : présence / longueur  | : | barbes / très longue (7,5 cm) |
| • Couleur à maturité                      | : | jaune                         |
| <b>GRAIN</b>                              |   |                               |
| • Couleur                                 | : | roux                          |
| • Forme                                   | : | allongée                      |

## CARACTERES AGRONOMIQUES

|                                                        |   |                                            |
|--------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|
| • Zone d'adaptation                                    | : | haute (>10000m) et moyenne (800m) altitude |
| • Cycle (à maturité)                                   | : | 125 – 130 jours                            |
| • Hauteur de la plante à maturité                      | : | longue (95 cm)                             |
| • Rendement moyen en saison pluviale                   | : | 2 – 2,5 t/ha                               |
| • Rendement moyen en contre saison                     | : | 3,5 – 4 t/ha                               |
| • Poids de 1000 grains                                 | : | 47,4 g                                     |
| • Egrenage à maturité                                  | : | résistant                                  |
| <b>Comportement vis-à-vis des maladies</b>             |   |                                            |
| • Rouille noire                                        | : | résistant                                  |
| • Rouille brune                                        | : | résistant                                  |
| • Oïdium                                               | : | résistant                                  |
| • Fusariose – Septoriose – Helminthosporiose – Charbon | : | non disponible                             |
| <b>Tolérance</b>                                       |   |                                            |
| • Verse                                                | : | résistant                                  |
| • Acidité du sol                                       | : | assez sensible                             |

## CARACTERES TECHNOLOGIQUES

|                           |   |                                                                                                    |
|---------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Qualité boulangère      | : | Farine apte à la panification                                                                      |
| • Aptitude culinaire      | : | Consommé en nature ou broyé en farine complète                                                     |
| • Utilisation potentielle | : | Alimentation humaine; alimentation animale pour engraissement du bétail et volailles (grains, son) |