

Maitotaho Sarigasy

Nom commun	Nom botanique	Code d'origine	Nature génétique	Origine	Numéro de référence (collection FOFIFA)	Obtenteur	Année de diffusion	Mainteneur
Manioc	<i>Manihot esculenta</i>	-	Clone	Région d'Andonaka	620	-	2006	FOFIFA


Branches apicales



Tubercules



Coupe transversale



CARACTERES MORPHOLOGIQUES

MORPHOLOGIE DE LA PLANTE

- Port : cylindrique
- Mode de ramification : érigé

TIGE

- Couleur de la tige : vert foncé
- Couleur des branches apicales : vert pourpre
- Mode de croissance des jeunes tiges : droit

FEUILLES

- Couleur des pousses : vert clair
- Couleur des pétioles : vert rougeâtre
- Forme du lobe central : lancéolée elliptique

TUBERCULES

- Pédoncule : absent (sessile)
- Forme : conique à cylindro-conique
- Couleur de l'écorce externe : marron foncé
- Couleur de l'écorce interne : blanc
- Couleur de la pulpe : crème

CARACTERES AGRONOMIQUES

- Zone d'adaptation : Moyen Ouest Sud
- Cycle à maturité : 10 – 12 mois
- Type de sol préféré : tanety
- Rendement moyen : 30 – 45 t/ha

Comportement vis-à-vis des maladies

- Mosaïque (CMD) : tolérant (score=2)
- Bactériose (CBB) : résistant
- Striure brune (CBSD) : Non évalué

CARACTERES TECHNOLOGIQUES

- Goût cru : doux
- Potentiel cyanogénique : faible
- Teneur en matière sèche : 34 – 36 %
- Teneur en amidon : 19 – 20 %