

Ray-grass : Tama

Nom commun	Nom botanique	Dénomination	Nature génétique	Origine	Obtenteur	Date de diffusion	Mainteneur
Ray-grass d'Italie	<i>Lolium multiflorum</i>	Tama	Lignée tétraploïde	Australie	CSIRO	1986	FIFAMANOR



CARACTERES MORPHOLOGIQUES

FEUILLE

- Couleur de la feuille : vert foncé
- Longueur (dernière feuille) : 26 – 35 cm
- Largeur (dernière feuille) : 6 – 9 cm

TIGE

- Port au tallage : dressé

EPI

- Type d'inflorescence : panicule
- Couleur de l'inflorescence : vert
- Longueur de la panicule : 27 – 30 cm
- Port des épillets : demi-dressé

GRAIN

- Couleur du grain : gris
- Dimension (longueur x largeur) : 7 mm x 1,5 mm
- Longueur de l'arête : 4 – 11 mm

CARACTERES AGRONOMIQUES

- Zone d'adaptation : 800 – 2000 m d'altitude
- Type végétatif : alternatif
- Cycle végétatif : annuel
- Photopériodisme : sensible (jour court)
- Apparition de l'inflorescence : fin octobre
- Hauteur à maturité : 80 – 90 cm
- Nombre de talle par pied : 5 – 13
- Poids de 1000 grains : 2,1 g
- Rendement moyen(MS) : 8 – 15 t/ha
- Rendement moyen (grains) : 300 – 400 kg/ha

Résistance

- Rouilles : moyennement résistant
- Gel : très résistant
- Verse : résistant

CARACTERES TECHNOLOGIQUES (Valeur alimentaire au stade de montaison)

MS (%)	MO (% MS)	CB (% MS)	MAT (% MS)	UFL/kg MS	PDIN (g/kg MS)	PDIE (g/kg)
17,00	89,00	25,30	17,70	0,82	133,00	85,00

Utilisation potentielle : Affouragement, couverture végétale